

PATOLOGÍAS SISTEMA CARDIOVASCULAR

HIPERTENSIÓN

SUPLEMENTACIÓN FUNDAMENTAL:

- 1° Limpieza de riñón (durante 6 semanas)
- 2° Limpieza de intestino y aceite de orégano(y recordatorio semanal)
- 3° Ascaris
- 4° Detoxificación de HM + glutonato potasico 1/3 en desayuno, comida y cena (precaución en pacientes con insuficiencia renal)

Realizar 4-5 limpiezas hepáticas, porque muchas veces las alteraciones en la producción de angiotensina viene de suciedad hepática

Sigue...

HIPERTENSIÓN (Continuación)

Añadiremos:

- ◆ MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 comidas (al menos 6 semanas)
- ◆ Ácido tiótico (Clark): 1 desayuno
- ◆ Vitamina C (Clark): 1 gramo en desayuno, 1 gramo en comida y 1 gramo en cena
- ◆ Coenzima Q10 (30mg. Clark): 1 en desayuno, 1 en comida y 1 en cena
- ◆ Selenio (Clark): 1 cápsula en desayuno
- ◆ Vitamina D (Clark): 1 cáps. en desayuno

Podemos añadir:

- ◆ Calcio (Clark): 2 en desayuno
- ◆ Magnesio (Clark): 1 en desayuno y 1 en cena


Sigue...

HIPERTENSIÓN (Continuación)


HOMEOGRAFÍAS (Opcional):

- ◆ Riñones
- ◆ Suprarrenales
- ◆ Hígado


➤ Take out heavy metals- riñones



➤ Take out HM-'L'-riñones



➤ Take out heavy metals-adrenales



Sigue...

HIPERTENSIÓN (Continuación)

ZAPPER (importante):

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping plates:
 - Set vascular (2-3 veces en semana)
 - Adrenales: 20'
 - Riñones: 20'

OBSERVACIONES:

Eliminar fuentes de sodio, grasas saturadas, café, té y bebidas carbonatadas.

Importante: beber agua sin metales (destilada, procedente de destiladora).

ARRITMIAS

(suele haber patógenos y tóxicos a nivel cardíaco)

SUPLEMENTACIÓN:

- 1° Programa de limpieza intestinal y aceite de orégano (5 gotas en cáp. vacía con 2 comidas)
+ Magnesio: 1 cena
- 2° Desparasitación de áscaris + magnesio: 1 cena
- 3° Limpieza renal + - Recordatorio semanal:
 - Tintura de nogal 3 cucharadas soperas
 - Aceite de orégano
 - Lugol 6 gotas 4 veces al día
 - Al terminar la limpieza renal, realizar 4-5 limpiezas de hígado y comenzar a tomar:
- 4°
 - ◆ MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 comidas
 - ◆ Magnesio (Clark): 1 cáps. en la cena (puede darse déficit de magnesio)
 - ◆ Acido fólico (Clark) : 1 cáps. en la cena
 - ◆ Complejo B (Clark): 1 desayuno
 - ◆ Coenzima Q10 (30 mg. Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
 - ◆ Vitamina C (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena

Sigue...


ARRITMIAS (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (Opcional):


◆ Corazón

◆ Take out drops:


➤ Heavy metals-riñones



➤ HM-'L'-riñones



◆ Take out drops heavy metals -corazón



Sigue...

ARRITMIAS (Continuación)

ZAPPER (importante):

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping plates:
 - ◆ grupo A: 20 minutos a diario
 - ◆ Corazón: 20 minutos a diario

OBSERVACIONES:

Evitar aguas con metales pesados (beber destilada)

En un principio, eliminar alimentos que puedan causar intolerancias:

- | | | |
|-----------------------|------------|-----------|
| ◆ Lácteos | ◆ Manzanas | ◆ Café |
| ◆ Cereales con gluten | ◆ Canela | ◆ Alcohol |
| ◆ Maíz | ◆ Azúcar | |
| ◆ Soja y derivados | ◆ Té | |

IMPORTANTE

- ◆ Zappicar los alimentos .

VARICES


SUPLEMENTACIÓN FUNDAMENTAL:

- 1° Programa de limpieza intestinal y aceite de orégano (5 gotas en una cáp. vacía con 2 comidas)
- 2° Programa de desparasitación de Ascaris
- 3° Limpieza renal + - Recordatorio semanal:
 - Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas
 - Aceite de orégano
 - Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día
- 4°
 - ◆ Limpieza hepática (una vez terminada la renal, realizar 4-5 limpiezas hepáticas)
 - ◆ Complejo B (Clark): 1 desayuno
 - ◆ Vitamina E (Clark): 1 desayuno
 - ◆ Vitamina C (Clark): 1 gramo en desayuno, 1 gramo en comida y 1 gramo en cena
 - ◆ Selenio (Clark): 1 desayuno
 - ◆ Bromelaina (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena

VARICES

HOMEOGRAFÍAS (Opcional):

- ◆ Grupo arterial
- ◆ Take out drops:
 - Heavy metals-riñones
 - HM-'L'-riñones



ZAPPER (importante):

- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping Plates:
- ◆ grupo arterial (arterias, venas y capilares): 20'

OBSERVACIONES:

Importante: Evitar estreñimiento

No consumir alimentos con Menadiona (por ser alérgeno de las venas) presente en cereales con gluten y verduras crudas.

ARTERIOSCLEROSIS

SUPLEMENTACIÓN:

1º DURANTE UN MES

- ◆ Vitamina C (Clark): 1 gramo en desayuno, 1 gramo en comida y 1 gramo en cena
- ◆ Complejo B (Clark): 1 comida
- ◆ Vitamina B3 (Clark): 1 desayuno y 1 cena
- ◆ Lisina (Clark): 1 cápsula 20 minutos antes de desayuno y comida
- ◆ Vitamina E (Clark): 1 cápsula en desayuno (sólo si no hay hipertensión)
- ◆ Selenio (Clark). 1 en desayuno
- ◆ Beta caroteno (Clark) 1 en desayuno
- ◆ IP 6 (Clark) 10 gotas antes de una comida + Papaína 6 cápsulas 1 hora antes de las comidas.

2º Limpieza renal (mínimo 3 semanas) y continuando con el resto de suplementación.

3º Limpieza intestinal y aceite de orégano (y recordatorio semanal) + Papaína 6 cápsulas 1 hora antes de las comidas.

Limpieza hepática (al finalizar la renal, realizaremos 4-5 limpiezas hepáticas)


También podemos añadir:

- ◆ Bromelaína (Clark): 4 ó 5 cápsulas 1 hora antes de desayuno, comida y cena
- ◆ Papaína (Clark): 4 ó 5 cápsulas 1 hora antes de desayuno, comida y cena

ARTERIOSCLEROSIS (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (opcional):

- ◆ Sangre
- ◆ Grupo arterial
- ◆ Hígado
- ◆ Take out HM de hígado **ZAPPER (Importante en fase 3):**
- ◆ Zapper regular de 60 minutos
- ◆ Zapping plates:
 - Sangre: 20'
 - Grupo arterial: 20'
 - Hígado: 20'



OBSERVACIONES: Es fundamental beber agua destilada.

Evitar cereales con gluten y verduras crudas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

LIBROS DE INTERES

Para cualquier pregunta sobre
La Terapia Clark contacte
con nosotros en:

info@clarktherapyon-line.com

